Godkända växtskyddsmedel.

Svenska Golfförbundet

20170125

PREPARAT	REG NR	KLASS	VERKSAM SUBSTANS

GODKÄNDA HERBICIDER

Starane 180 | **3838** | **2L** | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester**

Produktgodkännandet upphörde 2015-12-31. Produkten får överlåtas t.o.m. 2016-06-30 och lagras, bortskaffas och användas t.o.m. 2017-06-30. Temperatur vid bekämpning över 12C, endast godkänd för vårbehandling och ogräs i vegetativ tillväxt. Ej på greener
Max 1 behandling/år, maxdos 2,0 l/ha

Tomahawk 180 EC | **4460** | **2L** | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester**

Produktgodkännandet upphörde 2015-12-31. Produkten får överlåtas t.o.m. 2016-06-30 och lagras, bortskaffas och användas t.o.m. 2017-06-30. Temperatur vid bekämpning över 7-8C, endast godkänd för vårbehandling och ogräs i vegetativ tillväxt. Ej på greener.
Max 1 behandling/år, endast vårbehandling, maxdos 2,0 l/ha

Tomahawk 200 EC | **5236** | **2L** | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester 288 g/l**

Mot örtorgräs på golfbanor. Max 1 behandling per år. Maxdos 1,8 l/ha

TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

Roundup Bio | **3937** | **2L** | **Glyfosat (isopropylaminsalt)**

Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Mot ogräs och annan vegetation: Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 8 l/ha. Totala maximala dosen för inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingssäsong

Roundup Max | **4466** | **2L** | **Glyfosat (ammoniumsalt)**

Produktgodkännandet upphörde 2016-10-01. Produkten får överlåtas av innehavaren samt av andra t.o.m. 2017-03-31 och lagras, bortföras och användas t.o.m. 2018-03-31. Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Mot ogräs och annan vegetation: Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 4 kg/ha

GODKÄNDA FUNGICIDER

Sportak EW | **4188** | **1L** | **Prokloraz 450 g/l**

Produktgodkännandet upphörde 2015-12-31. Produkten får överlåtas t.o.m. 2016-06-30 och lagras, bortskaffas och användas t.o.m. 2017-06-30. Verkningssätt: lokalsystemiskt. Off label registrering (utvidgat användningsområde), mer information i Greenbladet 2/2006. Sportak godkänt för användning på greener under följande villkor: Dos 1,0 - 1,5 liter/ha, högst 3 behandlingar per år

Amistar | **4219** | **2L** | **Azoxystrobin 250 g/l**

Verkningssätt: systemiskt. Off label registrering (utvidgat användningsområde), mer information i Greenbladet 2/2006
Amistar godkänt för användning på greener under följande villkor: Dos 1,0 liter/ha, högst 3 behandlingar per år

Medallion TL | **5075** | **2L** | **Fludioxonil 125 g/l**

Verkningsätt: kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C
Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 l/ha och tillfälle

Banner Maxx | **5074** | **2L** | **Propikonazol 156 g/l**

Verkningssätt: systemiskt verkande även vid lägre temperaturer, rekommenderas vid marktemperturer över +6 grader C
Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdox 3 liter/ha och tillfälle

Headway | **5076** | **2L** | **Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l**

Verkningssätt: systemiskt verkande, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C
Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdox 3 liter/ha och tillfälle

GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

Primo Maxx | **5004** | **2L** | **Trinexapak (etylester)**

För tillväxtreglering på golfbanor och andra idrottsanläggningar belagda med gräs.
Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök med produkten. Max 15 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Max dos vid varje behandling: 3,2 l/ha. Totala maximala dosen får inte överskrida16 l produkt/ha och säsong

GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

Binab TF WP | **4420** | | **Trichoderma polysporum, T. atroviride**

Binab Golf respektive Binab Golf svampdödaren. Förebyggande. Får användas av alla och envar
behandlingsintervall 21-30 dagar, maxdos vid varje tillfälle: 0.6 kg/ha **Sprutråd:** Binab Golf: 0,6 kg/ha i 600 liter vatten. Eftervattna vid behov. Binab Golf Svampdödaren: 0,2 kg/ 0,1 ha i 200 liter vatten. Eftervattna vid behov. Produkten används under perioder och på ytor med högre risk för svampangrepp

Trianum-P | **5041** | | **Trichoderma harzianum stam T-22**

Behandling vid marktemperatur över +8 grader C. Behandling rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst.
Mer information: Lindesro AB 042-161870, 070-545 10 53, www.lindesro.se
Max 6 behandlingar/år, behandlingsintervall 28 dygn, maxdos per tillfälle: 0.45 g/m2

Mycostop | **4295** | | **Streptomyces griseoviridis stam K61**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label).
Mer information: Behandling vid temperatur över +15C. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 400 g/ha, max antal behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

Prestop | **4934** | | **Gliocladium catenulatum J1446**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor ((under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label).
Mer information: Behandling vid temperaturer mellan 5C och 15C. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 1 kg/ha, max antal behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

GODKÄNDA INSEKTICIDER

Merit Turf | **4803** | **2L** | **Imidakloprid 0,5vikt%**

Mot larver av trädgårdsborrar och harkrankar på golfbanor. Efter spridning måste produkten vattnas ner med 5-10 mm vatten.
Max 1 behandling/år. Maxdos/behandling 30 kg/ha

Sumi-alpha | **3753** | **2L** | **Esfenvalerat 50g/l**

Produktgodkännandet upphörde 2017-01-01. Produkten får lagras, bortskaffas och användas t.o.m. 2016-12-31

Rekommenderad dos: se produktens etikett, vid blandning av preparat hänvisas till företagens rekommendationer.

"För mer information, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen; www.kemi.se "Vid all bekämpning gäller att vindanpassat skyddsavstånd skall bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukssprutа med bom" "