

Godkända växtskyddsmedel.

PREPARAT REG NR KLASS VERKSAM SUBSTANS

GODKÄNDA HERBICIDER

Tomahawk 200 EC | 5236 | 2L | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester 288 g/l**

Mot örtgräs på golfbanor. Max 1 behandling per år. Maxdos 1,8 l/ha. Godkänt t.o.m. 2022-12-31.

Overtake | 5634 | 2L | **Fluroxipyr-1- metylheptylester och Florasulam**

Godkänt t.o.m. 31 december 2025. Mer information kommer under vintern/våren 2021.

TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

Roundup Ultra | 3937 | 2L | **Glyfosat (isopropylaminsalt)**

Mot ogräs och annan vegetation. Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 4 l/ha. Total maxdos får inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingssäsong. **Godkänt t.o.m. 2021-03-31.**

GODKÄNDA FUNGICIDER

Heritage | 5361 | 2L | **Azoxystrobin 50 vikt%**

Verkningsätt: Systemiskt. Heritage 5361 är godkänt mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar under följande villkor: Maxdos 0,5 kg/ha, max 2 behandlingar/år och minst 14 dagar mellan behandling. **Godkännande upphörde 2019-10-08.** Produkten får inte säljas efter 2020-04-07 och inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2021-04-07.

Heritage | 5574 | 2L | **Azoxystrobin 50 vikt%**

Verkningsätt: Systemiskt. Heritage 5574 är godkänt mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar under följande villkor: Maxdos 0,5 kg/ha, max 2 behandlingar/år och minst 14 dagar mellan behandling. **Godkänt t.o.m. 2025-12-31.**

Medallion TL | 5075 | 2L | **Fludioxonil 125 g/l**

Verkningsätt: Kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. **Godkänt t.o.m. 2022-10-31.**

Instrata Elite | 5466 | 2L | **Difenoconazol 80 g/l; fludioxonil 80g/l**

Verkningsätt: Kontakt och systemiskt. Mot svampangrepp på greener och tee. 1 behandling per säsong, maxdos 3 l/ha. **Godkänt t.o.m. 2021-10-31.**

Exteris Stressgard | 5461 | 2L | **Fluopyram 12.5 g/l; trifloxystrobin 12.5 g/l**

Verkningsätt: Systemiskt. Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Max 2 behandlingar, > 14 dagar mellan behandling, max dos 10 l/ha. **Godkänt t.o.m. 2025-01-31.**

Ascernity | 5681 | 2L | **Benzovindiflupyr 70,8 g/ha; Difenokonazol 236 g/ha**

Mot svampsjukdomar, till exempel dollar spot, på greener och tee. Max 2 behandlingar, minst 14 dagar mellan behandling, max dos 3 l/ha. **Godkänt t.o.m. 2022-12-31.** Mer information kommer under vintern/våren 2021.

GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

Primo Maxx | 5004 | 2L | **Trinexapak (etylester) 121g/l**

För tillväxtreglering på golfbanor och andra idrottsanläggningar belagda med gräs. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök med produkten. Max 15 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Maxdos per behandling: 3,2 l/ha. Total maximal årsdos 16 l/ha. **Godkänt t.o.m. 2021-04-30.**

Primo Maxx II | 5410 | 2L | **Trinexapak (etylester) 116g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Får användas mellan 1 mars och 30 nov, max 40 appliceringar/år, max intervall 7 dagar, max dos 0,4 l/ha, totalt max 16 l per säsong. (Rekommenderad dos och frekvens gäller för green. För tee, fairway och semiruff se etikett.) **Godkänt t.o.m. 2021-04-30.**

Clipless NT | 5320 | 2L | **Trinexapak (etylester) 120g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett. Max 24 behandlingar/år, behandlingsintervall 7 dygn. Maxdos per behandling: 3,2 l/ha. Total maximal årsdos 16 l/ha. **Godkänt t.o.m. 2021-04-30.**

Attraxor | 5549 | 2L | **Prohexadionkalcium 10 vikt%**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 21 dygn. Maxdos per behandling: 1,5 kg/ha. För rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök med produkten. **Godkänt t.o.m. 2023-12-31.**

GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

Trianium-P | 5041 | | **Trichoderma harzianum stam T-22**

Behandling vid marktemperatur över +8 grader C. Behandling rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst. Max 6 behandlingar/år, behandlingsintervall 28 dygn, maxdos per behandling: 0,45 g/m². **Godkänt t.o.m. 2021-04-30.**

Mycostop | 4295 | | **Streptomyces griseoviridis stam K61**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label). Behandling vid temperatur över +15 grader C. Ärligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 400 g/ha, max 5 behandlingar per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28. **Godkänt t.o.m. 2022-04-30.**

Prestop | 4934 | | **Gliocladium catenulatum J1446**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label). Behandling vid temperaturer mellan +5 och +15 grader C. Ärligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 1 kg/ha, max 5 behandlingar per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28. **Godkänt t.o.m. 2021-09-30.**

Mer information

Jordbruksverkets "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom" ska alltid användas (för Heritage, Medallion, Instrata Elite och Exteris Stressgard är det ett krav). Rekommenderad dos: se produktens etikett. Vid blandning av preparat hänvisas till företagets rekommendationer.

Preparat där godkännandet gått ut får, om inte Kemikalieinspektionen kommer med annan info,

- säljas sex månader efter registreringens utgång
- användas och lagras 18 månader efter registreringens utgång (vid ev. myndighetskontroll blir det anmärkning om den finns kvar i kemiförrådet)

För mer information om respektive produkt, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen: kemi.se.