

Godkända växtskyddsmedel.

PREPARAT REG NR KLASS VERKSAM SUBSTANS

GODKÄNDA HERBICIDER

Tomahawk 200 EC | 5236 | 2L | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester 288 g/l**
Mot ogräs på golfbanor. Max 1 behandling per år. Maxdos 1,8 l/ha. **Godkänt t.o.m** 2022-12-31.

TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

Roundup Ultra | 3937 | 2L | **Glyfosat (isopropylaminsalt)**
Mot ogräs och annan vegetation. Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. **Godkänt t.o.m** 2019-12-31.
Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 4 l/ha. Totala maximala dosen får inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingsåsong.

GODKÄNDA FUNGICIDER

Amistar | 4219 | 2L | **Azoxystrobin 250 g/l**
Verkningsätt: Systemiskt. Utvidgat användningsområde "Off label" UMPA. För användning på greener under följande villkor: Maxdos 1,0 liter/ha, max 3 behandlingar/år. **Godkännande upphörde** 2018-09-30. Produkten får inte säljas efter 2019-04-01 och inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2020-04-01.

Heritage | 5361 | 2L | **Azoxystrobin 50 vikt %**
Verkningsätt: Systemiskt. Heritage är godkänt mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar. **Godkänt t.o.m** 2022-12-31 under följande villkor: Maxdos 0.5 kg/ha, max 2 behandlingar/år och minst 14 dagar mellan behandling.

Medallion TL | 5075 | 2L | **Fludioxonil 125 g/l**
Verkningsätt: Kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C. **Godkänt t.o.m** 2020-10-31, max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle.

Banner Maxx | 5074 | 2L | **Propikonazol 156 g/l**
Verkningsätt: Systemiskt. Verkande även vid lägre temperaturer, rekommenderas vid marktemperaturer över +6 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall minst 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. **Godkännande upphörde** 2019-06-19. Produkten får inte säljas efter 2019-12-20 och inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2020-03-20.

Banner Maxx II | 5440 | 2L | **proiconazol 162g/l**
Verkningsätt: Systemiskt. Verkande även vid lägre temperaturer, rekommenderas vid marktemperaturer över +6 grader C. Max 2 behandlingar/år på green och tee, behandlingsintervall minst 21 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. Max 1 behandling vartannat år på fairway. **Godkännande upphörde** 2019-06-19. Produkten får inte säljas efter 2019-12-20 och inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2020-03-20.

Headway | 5294 | 1L | **Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l**
Verkningsätt: Systemiskt. Verkande mot svampangrepp på golfbanor, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Användning med max 2 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. **Godkännande upphörde** 2019-01-31. Produkten får ej säljas efter 2018-08-31 och inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2019-08-31.

Instrata Elite | 5466 | 2L | **Difenoconazol 80 g/l; fludioxonil 80g/l**
Verkningsätt: Kontakt och systemiskt. Mot svampangrepp på greener och tee. 1 behandling per säsong, maxdos 3 l/ha. **Godkänt t.o.m** 2019-10-31.

Exteris Stressgard | 5461 | 2L | **Fluopyram 12.5 g/l; trifloxystrobin 12.5 g/l**
Verkningsätt: Systemiskt. Mot snömögel på tee, green och krage. Max 2 behandlingar, > 14 dagar mellan behandling, max dos 10 l/ha. **Godkänt t.o.m** 2019-07-01

GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

Primo Maxx | 5004 | 2L | **Trinexapak (etylester) 121g/l**
För tillväxtreglering på golfbanor och andra idrottsanläggningar belagda med gräs. **Godkänt t.o.m** 2021-04-30. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök med produkten. Max 15 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Maxdos per behandling: 3,2 l/ha. Total maximal årsdos 16 l/ha.

Primo Maxx II | 5410 | 2L | **trinexapak (etylester) 116g/l**
För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. **Godkänt t.o.m** 2021-04-30. Får användas mellan 1 mars och 30 nov, max 40 appliceringar/år, max intervall 7 dagar, max dos 0,4 l/ha, totalt max 16 per säsong. (Rekommenderad dos och frekvens för green. För tee, fairway och semiruff se etikett.)

Cliplless NT | 5320 | 2L | **Trinexapak (etylester) 120g/l**
För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett. **Godkänt t.o.m** 2021-04-30. Max 24 behandlingar/år, behandlingsintervall 7 dygn. Maxdos per behandling: 3,2 l/ha. Total maximal årsdos 16 l/ha.

GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

Binab TF WP | 4420 | | **Trichoderma polysporum, T. atroviride**
Binab Golf respektive Binab Golf svampdödaren. Förebyggande. Används under perioder och på ytor med högre risk för svampangrepp. **Godkänt t.o.m** 2019-04-30. Behandlingsintervall 21-30 dagar, maxdos per behandling: 0,6 kg/ha. Sprutråd: Binab Golf: 0,6 kg/ha i 600 liter vatten. Eftervattna vid behov. Binab Golf Svampdödaren: 0,2 kg/0,1 ha i 200 liter vatten. Eftervattna vid behov.

Trianium-P | 5041 | | **Trichoderma harzianum stam T-22**
Behandling vid marktemperatur över +8 grader C. Behandling rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst. **Godkänt t.o.m** 2019-04-30. Max 6 behandlingar/år, behandlingsintervall 28 dygn, maxdos per behandling: 0,45 g/m².

Mycostop | 4295 | | **Streptomyces griseoviridis stam K61**
Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label). Behandling vid temperatur över +15 grader C. **Godkänt t.o.m** 2020-04-30. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 400 g/ha, max 5 behandlingar per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

Prestop | 4934 | | **Gliocladium catenulatum J1446**
Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label). Behandling vid temperaturer mellan +5 och +15 grader C. **Godkänt t.o.m** 2020-07-31. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 1 kg/ha, max 5 behandlingar per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

Mer information

Jordbruksverkets "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom" ska alltid användas (för Medallion, Banner Maxx, Instrata Elite, Exteris Stressgard och Heritage är det ett krav).

Rekommenderad dos: se produktens etikett. Vid blandning av preparat hänvisas till företagets rekommendationer.

Preparat där godkännandet gått ut får, om inte Kemikalieinspektionen kommer med annan info,

- säljas sex månader efter registrerings utgång
- användas och lagras 18 månader efter registrerings utgång (vid ev. myndighetskontroll blir det anmärkning om den finns kvar i kemförrådet)

För mer information om respektive produkt, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen: kemi.se.