

# Godkända växtskyddsmedel.

PREPARAT                      REG NR                      KLASS                      VERKSAM SUBSTANS

## GODKÄNDA HERBICIDER

**Tomahawk 200 EC** | 5236 | 2L | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester 288 g/l**

Mot örtgräs på golfbanor. Max 1 applicering per år. Maxdos 1,8 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-31.

**Overtake** | 5634 | 2L | **Fluroxipyr-1- metylheptylester och Florasulam**

En applicering per år. OBS: endast vårbehandling. Dos vid nyetablering 0,75 l/ha, dos i etablerad gräsyta 1,8 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-31.

## TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

**Roundup Ultra** | 5773 | 2L | **Glyfosat (isopropylaminsalt)**

Mot ogräs och annan vegetation. Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Max 3 appliceringar/år. Maxdos per applicering: 4 l/ha. Total maxdos får inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingssäsong. **Godkänt t.o.m.** 2025-09-15.

**Credit Xtreme** | 5602 | 2L | **Glyfosat (isopropylaminsalt 400,8g/l, kaliumsalt 297,7 g/l)**

Mot ogräs och annan vegetation på vall, gräsbevuxna idrottsanläggningar, gräsmattor. Max 1 applicering per år. Maxdos 2,66 l/ha (1,44 kg glyfosat/ha). Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. **Godkänt t.o.m.** 2024-12-15.

## GODKÄNDA FUNGICIDER

**Heritage** | 5574 | 2L | **Azoxystrobin 50 vikt-%**

Verkningsätt: Systemiskt. Mot svampangrepp på tee och green på golfbanor. Max 2 appliceringar/år, minst 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 0,5 kg/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-31.

**Medallion TL** | 5075 | 2L | **Fludioxonil 125 g/l**

Verkningsätt: Kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C. Max 4 appliceringar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Maxdos per applicering: 3 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2026-06-15.

**Instrata Elite** | 5466 | 2L | **Difenokonazol 80 g/l; Fludioxonil 80g/l**

Verkningsätt: Kontakt och systemiskt. Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. **Godkänt t.o.m.** 2024-12-31.

**Exteris StressGard** | 5799 | 2L | **Fluopyram 12,5 g/l; Trifloxystrobin 12,5 g/l**

Verkningsätt: Systemiskt. Mot dollar spot och snösmögel på tee, green och krage. Max 2 appliceringar/år, > 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 10 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-01-31.

**Ascernity** | 5681 | 2L | **Benzovindiflupyr 23,6 g/l; Difenokonazol 78,8 g/l**

Mot svampsjukdomar, till exempel dollar spot, på tee och green. Max 2 appliceringar, minst 14 dygn mellan varje. Maxdos per applicering: 3 l/ha. OBS: se särskilda regler kring reducering av vindavdriften i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. **Godkänt t.o.m.** 2027-03-15.

**Signum** | 4884 | 2L | **Pyraklostrobin 6,7 vikt-%; Boskalid 26,7 vikt-%**

Verkningsätt: Systemiskt. Mot dollar spot och snösmögel på tee, green och krage. Får användas juni-november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar. **Godkänt t.o.m.** 2026-09-15.

## GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

**Primo Maxx II** | 5410 | 2L | **Trinexapak (etylester) 116g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Får användas mellan 1 mars och 30 nov, max 40 appliceringar/år, behandlingsintervall 7 dygn. Maxdos per applicering: 0,4 l/ha, totalt max 16 l per säsong. Rekommenderad dos och frekvens gäller för green. För tee, fairway och semiruff, se etikett. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-15.

**Clipless NT** | 5320 | 2L | **Trinexapak (etylester) 120g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett. Max 24 appliceringar/år, behandlingsintervall 7 dygn. Maxdos per applicering: 3,2 l/ha. Total maximal årsdos 16 l/ha. **Godkänt t.o.m.** 2025-12-15.

**Attraxor** | 5549 | 2L | **Prohexadionkalcium 10 vikt-%**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Max 4 appliceringar/år, behandlingsintervall 21 dygn. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha. För rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök. **Godkänt t.o.m.** 2027-05-31.

## GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

**Trianium-P** | 5041 | 2L | **Trichoderma harzianum stam T-22**

Applicering vid marktemperatur över +8 grader C. Applicering rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst. Max 6 appliceringar/år, behandlingsintervall 28 dygn. Maxdos per applicering: 0,45 g/m<sup>2</sup>. **Godkänt t.o.m.** 2026-04-15.

**Mycostop** | 4295 | 2L | **Streptomyces griseoviridis stam K61**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare off-label). Applicering vid temperatur över +15 grader C. Ärligen återkommande applicering endast på greenområden. Max 5 appliceringar per år, behandlingsintervall 21-28 dygn. Maxdos per applicering: 400 g/ha. **Godkänt t.o.m.** 2026-03-31.

**Prestop** | 4934 | 2L | **Gliocladium catenulatum J1446**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare off-label). Applicering vid temperaturer mellan +5 och +15 grader C. Ärligen återkommande applicering endast på greenområden. Max 5 appliceringar per år, behandlingsintervall 21-28 dygn. Maxdos per applicering: 1 kg/ha. **Godkänt t.o.m.** 2035-03-31.

**Harmonix Turf Defence** | 5857 | 2L | **Bacillus amyloliquefaciens**

Mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Produkten får användas vid max 10 tillfällen per år samt med minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle: 25 l/ha. **Godkännande upphörde** 2024-05-01. Produkten får inte säljas efter 2024-05-01 och inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2025-04-01.

## Mer information

Jordbruksverkets "Hjälpreda" för bestämning av vindpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom" ska alltid användas. Information om avdriftsreducerande utrustning (spridare) finns på [sakertvaxtskydd.se](https://www.sakertvaxtskydd.se). Rekommenderad dos: se produktens etikett. Vid blandning av preparat hänvisas till företagets rekommendationer.

Preparat där godkännandet gått ut får, om inte Kemikalieinspektionen kommer med annan info, säljas sex månader efter registrerings utgång, samt användas och lagras 18 månader efter registrerings utgång. Därefter blir det anmärkning om den finns kvar i kemiförrådet vid ev. myndighetskontroll.

För mer information om respektive produkt, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen: [kemi.se](https://kemi.se).